

**DE FEBRIUM
PATHOGENIA
ANIMADVERSION
ES QUAS AD
MEDICINAE...**

Giuseppe Ganz, Valentino
Crescini



DE
FEBRIUM PATHOGENIA
ANIMADVERSIONES

QUAE
 AD MEDICINAE LAUREAM ASSEQUENDAM
 IN PRÆCEPTO ARCHIEPISCOPI PATAVINI

FELICE DESCHIT
JOSEPH GANZ

VERONICAE



PATAVII

EX TYPIS VALENTINI CRONCHI
 MDCCCXX



ANIMADVERSIONES DE FEBRUM PATHOGENIA

Certe febres, de quibus consilium temporum medici multa et inter se discrepantia scripserunt, familiam prope infinitam morborum apparentium constituent: diu apparentiam, quoniam febres generationis et universae sumptae non sunt morbi, sed potius morborum effectus, ut ex nostrorum temporum medicis innotescens demonstratum fuit argumentis: quare hiis etiam diebus aliquis inter medicos artis professores reperitur, qui *essentiam febris* admittit. Hinc apud Hildebrand alia est *febris morbus*, et alia *febris symptoma*; quae distinctio huic respondet, per quam alia est *febris primaria et essentialis*, alia *secundaria*.

Febris a *ferreo* quod ardere significat, derivatur. Apud Orientis populos vox febris non tam a caloria, quam ab ignis sensatione orta videtur. Hinc febris appellata fuit *pir*; ex quo *pirexia* febris, *apirexia* destitutio

febris, pirologia tractatus de febribus, veniunt.

²⁹ Si definisce una cosa, ait cel. Buffalini, „ a dichiarando la sua essenza, o descri-
„ vendo tutte le proprietà, o solamente
„ alcune di queste, che sia origine alle al-
„ tre, o di maggior momento „.

Quomodo medici sem omnes essen-
tiales febrium conditionem ignorabant, ita
primam definitionem reperiunt. Cum vero
febris definitio quae deducitur ab omnibus
ejusdem proprietatibus, paucis non compre-
hendat nisi ideam objecti (et nonne in ca-
sa febris) quod definiri debet, ita tertiam
definitionis modum secuti sunt. Hinc inter
innumerablem febrium phaenomena, ea pro-
tulcerunt, quae pro caeteris frequentius et con-
stantius offerbantur observationi, et ex his
magis vel minus in numero simul sumptis,
febris definitionem deduxerunt.

Haec sunt febrium symptomata: conturba-
tio animalis temperantiae, quae se se offert
aut immixtum, et hinc horripilationes et fri-
gus febrilis; aut auctam, et hinc caloris aug-
mentum: cordis et artiarum celerior pulsa-
tio: doloris et lassitudinis sensatio: debilitas
spontanea: sitis, et oris ariditas nasellarum,
vel omnium facieiurum aestus.

Febris tamen definitio ex hiis phaenome-
nis desumpta rei definitae haud aeque re-
spondet. sunt enim quaedam phaenomena,
quae nonnullis in febribus, et in quibusdam

definitis ipsarum studiis circumscribunt; quaedam aliis aliis morbis sunt communia, nec diversa in diverso organismi stata.

Et revera quoad conturbationem temperaturae animalis, nemo est qui ignoret, non omnibus in febribus adesse caloris augmentum, ut in febre intermittente algida *Forti*, in qua paroxysmus omnis in frigore est positus. Praeterea non omnibus in studiis febrium intermittentium caloris augmentum habetur; quin etiam in febribus continuis eorum augmentum ab elgidis horripilationibus indicatur. Hinc omnibus patet, non esse adnotandum febri definitionem, quam nobis dedit Celsus, qui cum dixit calorem praeternaturalem. Neque frigens est constantis febris symptomus habentur enim febres, in quibus frigidum studium desideratur, et a solo calore et calore nervos accipiunt; praeterquamquod caloris et frigoris sensationes ad alios quoque morbos, affectiones pertinent.

Quoad vero celeritatem cordis et arteriarum pulsationem, non omnibus in febribus, neque in variis ipsarum studiis majori vi et frequentia arteriae pulsant: praeterea nec caloris augmentum, nec pulsus celeritas febris praesentiam semper indicant. Et revera plerumque aliae causae, nempe nimium corporis exercitium, curae, ira, ventus, cibus nimis copiosus, vini generosi et spirituosorum liquorum potus celeritatem reddunt pulsam, atque calorem augent.

Etiā doloris et lassitudinis acutatio, spontanea debilitas, sitis, oris ariditas, nuchallorum, vel omnium functionum læsio sunt phænomena non admodum essentialia, et plurimis aliis morbosis affectionibus communia. Hinc non est admittenda definitio, quam nobis dedit Sauvages, juxta quem febris est: *Syndroma frigoris successivique caloris, cum artuum debilitate, et pulsu vi aducto, sæpe quoad frequentiam*. Nec illa Vogel, qui definiit febrem, ut sit *augmentum præternaturale innati caloris cum siccitate, et ariditate corporis*.

Ex his patet, quam sit difficile, ut dicam impossibile, admittere tertiam definitionis modum, quare sit cæteris præferendus: non est enim admittenda illa definitio, quæ ab essentia deducta. Brevem igitur, generalem et definitum febris descriptionem, quæ loco definitionis haberi possit, adhuc desideramus, et tertium dia desiderabimus.

Hinc celeb. Boerhaave secundum definitionis modum amplecti videtur: *Enque, sit illa, cum summa febris, sive in accessione, sive in augmento, aut inclinatione, decursu, neque pro generis, causarum, symptomatum, et subjectorum ratione varietatem præseferant, quæ paucis verbis apte negari comprehendere magis interest, ampliorum diligentiorumque febris tradere descriptionem, ut à symptomatibus propriisque affectionibus, quæ tamen scindas et obvias sūt,*

atque a medicis attendi possunt, aliqua absolute certiorque ejus notitia habeatur, quo facilius de ea praesente judicium ferri possit. Hinc ille vellet hanc deducere descriptionem et a statu pulsat, calore, cutis, et a statu urinae, et a colore et habita faciei, oculorum et linguae: denique observandum erit, si una vel plures functiones a statu naturali aberrant. Concedit tamen, morbos esse ea phaenomena a quibus qui febricitat, constanter afficiuntur. "Sunt, ille, aut, ut phorismam vel corroborant, vel riget, vel friget, variis autem deliquis corrigitur, aut in omnem propadat; paullo post calore ingenti et diutius protracto cum anxietate quadam atque in primis vixum languore, sitis orisque siccatate, capitis dolore, aut gravitate, aut aere, aliisque afficitur modestius."

Haec retuli ex celeb. Boenieri de prompta, ut omnibus innotescat, prima et constantiori febris phaenomena ea esse, quae morbosum statum indicant in organis, quae circulationem, respirationem, calorificationemque promovent atque servant, et ad organicam vitam spectant: quae omnia, ut spero, multum inservient, non dicam, ad deducendam veram morbi ita protiformis aetionem, sed saltem ad indicandam veram ejusdem sedem. Et hoc verum esse, deducitur ex majore scriptorum numero, qui in febre definienda ea ceteris praestulerunt phaenomena, quae lesionem aliquam indicant iis in orga-

8

nā, a quibus sanguinis calor pendet atque circulatio.

Hinc medicinae pater Hippocrates, cum quendam febre correptum indicare volebat, hunc calore magno et urente correptum dicebat. Hinc Galenus docebat, febrem esse calorem praeternaturalem, quem pulsus pleni, vehementes, atque frequentes comitantur. Hinc et alii statuerunt, febrem esse praeternaturalem sanguinis ferorem; alii inter quos primus auctor locum Willis, esse fermentum sanguinis; alii ut Bellini, vitium sanguinis, aut in motu, aut in quantitate, aut in qualitate, aut in uno tantum et hoc vitio, aut in omnibus simul sumptis. Boerhaave posuit febrem in aucta pulso velocitate cum obstructione vasorum capillarum propter tardam in ipsis circulationem: et Cullen, in quadam minorum vasorum atonia, quam spasmus sequitur, per quem cordis et majorum arteriarum actio augetur. Tandem Boerhaave putat, febrem consistere in perturbata quadam scribilitate et irritabilitate cordis et arteriarum, hoc est totius aequalitatis circulationis, ceterarumque functionum propter sanguinis ceterarumque fluidorum vitium, aut in quantitate, ut ille scribit, aut in coactione, aut in qualitate.

Antequam ex iis quae adhuc diximus, ea deducantur, quae brevius ad veram proximamque febrem eodem nos perducant, et hoc pacto facilius et brevius reddatur via, per

quam veram ejusdem nosogomalia attingere possimas, breviter quae institutum temporum medici, et Iuli et Galli, hac de re scripserunt, percurramus.

Quo tempore Galenus discipulique ejus florebant, febres dividebantur in *essentiales* et *symptomáticas*; illae in generali totius organismi vitio penderent erant; haec tantum in affectione quadam peculiari alienae partis organismi ejusdem. Juxta Brown febres omnes *essentiales* erant; omnes praeter synochas, ab universali aeternis pendebant: et juxta eundem auctorem vitiū debilitatis gradus sunt febrium intermittendum studia, *frigoris* spectabat illae, *marino* debilitas, *caloris* auctor, *ardoris* minima est. Pinel quoque medicus Gallicus dividebat febres in *primarias* seu *essentiales* et in *symptomáticas*: illae sex ordinem comprehendebant, nempe: 1.^o febres angio-sibéricas, seu inflammatorias; 2.^o meso-gastricas, seu gastricas; 3.^o adeno-meningeas, seu mucosae; 4.^o adinamias; 5.^o atonicas; 6.^o adeno-nervosae; haec perem continuant.

Cel. Baseri theoriam Brown medicatus est, et ostendit non omnes febres esse *arthénicas*; quia etiam probavit, majorem febrium denarum *athénicas* comprehendere, quam levis variabiles sint, ut ipse opinatus est, contrariis conditionibus: uno verbo, juxta hujusmodi viri sententiam, omnes febres sunt *essentiales*, quae aut a stimuli, aut a constitutionalis diathesi pendent; quoniam illae haec numero

longe superent. Giannini cum Brown restitit, omnes fere febres, si veras inflammatorias excipias, in statu quodam debilitatis essentialiter esse positas, quem subsequeretur quaedam vitallium vicium exaltatio, & praecedente orta debilitate, quae nervitibus improprie appellatur.

Jam Sauvages in Nosologia ostendens, nullius esse momenti divisionem illam febrium, per quam alias sunt *essentiales*, *symptomáticas* alias, cum nulla sit febris *essens*: nullo enim pacto concipi potest febris, quam non producat, non precedat, non aliat, aliqua morboſa affectio. Neil putabat, febres omnes esse exaltationem quandam localem, aut generalem excitabilitatis, et organum quaecunque febris sedem esse posse. Et jam nonnulli ex recitationibus laudis medicis, qui irritationis theoriam sunt secuti, ut Bondioli, Rubini, Farago, praeter febres *essenciales* quae vel a stimuli, vel a constitutionalis diathesi pendunt, admittunt etiam illas, quae partialis organorum morbi ab irritantis potentiae actione productas gignit: hinc etiam *irritationes* admittunt.

Gel Professor Tommasini maximam applaudit arti medicae incrementum. Argumenta quae infringi nequeant, ostendit, febres fere omnes esse indolis *ipsarum*, seu inflammatorias, et hoc in casu a pathologico processu originem ducere, qui aliquo ab organo ad universale systema diffunditur. Novellas tamen

admittit febres, quae a diathesi ipsothetica, et alias quae a simplici actione irritativa pendunt, quae causa irritante subita, et ipse tolluntur; et si aliquando perdurant, id ex eo evenit, quod in irritata parte phlogistica processus excitatus fuit. Febres haec et illae quae ab excessuum stimulorum actione oriuntur, quaeque evanescunt stimulis liodem evanescentibus, dummmodo non existat phlogosis, adiabesicos tantum processus constituant. Denique medici Galli, quorum princeps est Broussais, febribus essentialibus omnino posthabitis, volunt febres omnes esse symptomaticeas et secundarias, et originem ducere ab irritatione ceterorum tentata et inflammatione, quae ad eae per sympathiam propagatur, sed eodem in eorde residet. Broussais autem nimis incessitudo, si verum est standum, febres omnes ad gastro-enteritidem, aut acutam, aut chronicam, refert.

Ex hinc recentiorum medicorum inquisitionibus medicinam maxime profecisse, nemo est qui neget: patet enim, febrem non esse morbum, sed alicujus morbi symptoma; et hinc studium omne atque curam esse vertendam non ad symptoma, sed ad morbosam affectionem, ex qua idem symptoma oritur. Et revera febres omnes pendunt aut ab irritatione, aut ab inflammatione, et hujus ab exitu, quae habetur aut in organis ad systema circulare spectantibus, aut in organis remotioribus, sed tamen ita, ut hujusmodi affectiones in illud

sympatice agunt: quae idem vocant, ac si diceremus, quatenus in febri idem symptomata circulariter aut idiopater aut sympatice morbo affici sojnt in vitabilibus conditionibus, et febrem nihil aliud esse nisi manifestationem, seu symptomata hujusmodi perturbationis.

Si sermo sit de febribus quae a perturbatione sympatica in vitalibus systematibus circularibus conditionibus originem ducunt, hujusmodi febres, ut dixi superius, oriri possunt et a simplici irritatione, et ab inflammatione certa, aut ab hujus exitu, in aliquo remoto organo. Et quapropter medici Galli duabus hinc vocibus irritatione, inflammatione, percipiscut utantur, nos tamen eam significationem quam habent superius tribuimus, non relinquentes. Hinc alia est febris, quam producit vermium praesentia in tubo gastro-enterico priusquam vermes idem phlogisticam affectionem in ejsdem tubi partibus periant: alia quae a contagioso principio quod in machina habetur, venit, antequam principiare hoc ita in organismum effundatur, ut aliquo in viscere nobiliori inflammationem excitet: alia est febris ephémèra, quae a substantiarum stimulantium (quae deinde potentius irritativas fiunt) nimietate pendet, et ita gravis evadit, ut encephalidem minuetur, et alia est febris quae a processu phlogistico jam praecedente oritur. Nam febris vermiculosa vermium, contagiosam contagiosorum principiorum expulsio vincet: immoderatam stimulantium effusi-

ratio fugabit febrem ephemeram, quae erysipelatoidem minatur; in qua citius fluxus sanguinis ad cerebrum sit administrandus, nondum tamen phlogisticis processibus excitatus sit: dum febris quae a phlogosi pendet, non vincitur, nisi prius phlogosis ipsa vincatur.

Medici quoque Galli statum morbosum inter potentiarum morbosorum actionem, et eandem irritationis extricationem in febribus admisit, subinflammationem scilicet et inflammationem: qui status morbosus ab Italia irritativus appellatur; quem etiam sedationem appellare vellet, in quo locum potest habere coma, asphæcia, virium defectio, abolitio sensus et motus, mors denique ipsa, si huiusmodi status nimis diu protrahatur. Huiusmodi statum admittere debuerunt ex eo, quod in cadaverum incisione sensibili perturbationis indicia minime intuerent. Sed ita opinantes nihil aliud, nisi verba verbis, ideas ideis, et quod in populo cedit, nomen improprium necnon ad eandem ideam explicationem aptissime substituerunt. Et reversi in statu de quo loquimur, non semper debilitatae functionis phaenomena habentur, sed interdum etiam auctae actionis symptomata haberi possunt, ut vomitus, convulsiones, rigidae, subdelirium, febris etc., quo in casu vox sedationis, quam improprie adhibetur? Cur igitur omittamus verbum irritationis, quod utroque horum casus complectitur?

Sed veniamus ad febres inflammatorias,

semper ad eas quæ originem docent a phlogosis processu plures minute apertæ in aliqua machinæ parte præexistente. Huiusmodi febres præexistenti phlogosi processui solent esse secundariæ. Quod si aliquando videmus, febrem inflammatoriam processui præcurre, id ex eo pendet, quod febris hæc potest esse secundaria irritationi simplici idiopathicæ vel sympathicæ partis illius, cui phlogisticus processus est subeundus; aut pendere potest ab aliquo alio inflammatorio processu, per quem normæ processus secundarie excitetur alia in parte, quæ cum illa per sympathiam communicet eo communicandi modo, quem Boerhaave *divergentem* appellat. Ut aliquis in parte phlogosis processus existat, et febris statim habetur, si prius non aderat; et si aderat, augetur: et hoc actionis augmentum in systemate circulari in causa est, cui sanguis conditionem illam acquirit, per quam a vasæ extractus crassum phlogisticum efformat.

Febres quæ ab idiopathia circulari systematis perturbatione præcedunt, sunt illæ, quæ ab angiotide præcedunt. Hinc febris ipsa synocha, quæ quondam essentialis putabatur, nunc habetur ut processus angioticus, qui juxta Sæmæ, et Pet. Frank observationes, a corditide, pericarditide, etc. derivatur.

Quæ causa facile nobis persuadet, febrem non esse nisi effectum perturbationis diæmico-organicæ primitivæ, aut sympathicæ cordis, et circularis systematis. Juxta Boer-

alis quoque, ut videmus, *febris effectus est irritationis primitivae et sympathicae cordis, per quam rursus hae rursus contractiones accelerantur, augentur circulatio, et tanta fit cutis ariditas, ut jade manifesta sensatio habeatur.*

Sed definitio haec potestne etiam febribus intermittensibus applicari? Nemini dubium esse potest. Possunt enim tales febrium distinctiones ab eademdem typo desumptae, qui typus accidentalem tantum differentiam inter febres statuit; et ab omnibus medicis, ad exemplum Prael. classificatione admissa, quae eam habet fundamentam in symptomatum, aut ut rectius dicam, in morborum conditione, quae illas parit, praesidia, admisso ad subdivisionem secundariam tantum instituentem typo, febres quales distribuisse fuerunt in *legitimas aut ipsothemicas, in ipsothermicas, aut ischaemicas, et in irritativas, prout originem trahunt aut a statu quodam generali acrioris, aut ab opposita excitabilitatis conditione, aut ab aliqua irritatione.*

Sed omnibus parci, divisionem hanc esse falsam, neque ideo admittendam, quippe quae instituitur diathesibus, et quibus essentiales morborum differentiae descendere debent. Cel. Prael. Brota, hanc eandem divisionem rejicit, sub aspectu tamen valde diverso, et certioribus iuris argumentis contendit, conditiones diatheticas, ipsothermicam et ipsothemicam, esse tantummodo accidentales febrium

complicationes, non ipsarum causam atque fundamentum. *Febres*, ait ille, *sunt semper affectiones locales: in ipsis primum tenet locum conditio irritativa: status isperanthemica, sive isperthemia, non est nisi accidentalis in febribus.* Quenam vero est sedes illius pathologicae conditionis, ex qua febris oritur? Systema tripplanicum aut gangliare. Ego quoque has de febribus doctrinas, quas illustris Clinicus, quondam hujusce Aschigynaei lumen, edidit, libenter amplector cum de febrium, et praecipue intermittentium, pathogenia agitur, his laudis argumentis.

Medici omnes antiqui atque ac recentes, quoad febrem, in hoc consentiunt, ut veluti certa atque constantia ejusdem phaenomena ea considerent, ex quibus in actione et motu cordis et systematis circularis maxima laesio deducitur. Physiologia nos docet, motus hic tam cum salus riget, ab his nervosis centris, seu gangliis ex quibus simul sumptis tripplanicum systema habetur, moderari. Anathomia quoque nos docet, nervos cardiacos superficiales et profundos a primis hujusce nervosae partis gangliis oriri. Hinc necessario sequitur, hujusmodi motus si morbois sint, tales esse propter praesentandam horum nervorum conditionem aut primitivam, aut secundariam, aut idiopathicam, aut sympathicam, aut congestivalem. Et si hujusmodi in motibus perturbatis circularis systematis febris praecipue consistit, sequitur etiam hanc per-

dere ab irritatione, a phlogosi aut idiopatica aut sympathica systematis gangliaris, et præcipue illorum gangliorum, et nervorum, qui cordis majorumque vasorum motibus hærent, et a quibus irritatio, aut phlogosis majori aut minori vi et apatio, in alias systematis partes se se effundere potest. Hinc alia quoque organa ejusdem difformi, aut aliis systematibus cum ipso per sympathiam communicantibus subjecta, perturbari possunt.

Ex his quæ hæcenus diximus, hæc sequuntur corollaria:

I. Perturbationes irritativæ et inflammatoriae variorum nostri corporis tractuum, cum ad systema gangliaræ per irradiationem se se effundant, febrem secundarie excitant. Hinc hæc eodem per processus inflammatorio, aut per simplices irritationes alia quoque organa plura minime ab hoc systemate remota, invadit.

II. Cum actio dinamica pericetum vasorum quæ circularem apparatus componunt, propter statum pathologicum triplex systematis perturbationem subeat, fluida quoque quorum motus ab apparatu circulatori moderatur, et præcipue sanguis sua in mixtione, perturbationem aliquam subibant. Ita cum molecule quædam vitiales atque morbosæ incensus diversarum partium perirent, solida quoque in sua assimilari proportionem erant perturbata: et hinc internaliter respondebant externarum potentiarum, quævis non nove

sint, impressionibus, et ita secundariis quidam, insurgunt variae turbae remotionibus etiam in partibus: quae turbae alia quoque et causa insurgunt, nempe propter consensum, quare systema gangliare suis multiplicibus filamentis cunctis cum humani corporis partibus et praecipue cum nervos vias animalia systemate servat. Et haec duae sunt causae, per quas febris quae sua in origine erat morbus localis, affectionem universalem simulare possit; quibus addenda est tertia, nempe organi, quod primas febres intrinsecas, cum ceteris organo consensum plura minime existant.

III. Quartas generatis febres inflammatorias, ut superius diximus, phlogosis partialis aliquo in organo procedunt sicut secundariae; interdum tamen et inflammationes possunt esse febribus secundariae: et id ex eo est repetendum, quod organum aliquod potest irritari, aut inflammari symptotice propter statum morbum gangliarum systematis aut idiopathici, aut sympathici alicui diversi generis affectioni. Hinc exsipelum, eruptiones cutaneae, impetiginosae, aut exanthematicae febribus solet praecedere; hinc lenae phlogosin ad stomachum, ad splenem, ad hepatis, quae post longam intermittentium febrium cursum habentur: hinc rejicienda ut falsa, quae Zoonalis in medium affert, nempe febres omnes, quae ut essentielles habentur, a gastrica, aut gastro-enterica pendere; quartas hujusmodi

morbosae affectiones una cum febribus intermittētibz praecipue et frequentius sociantur; concedendum tamen est interdum febres ipsas intermittētes a gastridē, aut gastroenteridē pendere posse. Frequenter tamen hujusmodi gastricorum viscerum perturbaciones nunc irritativae, nunc inflammatoriae, febribz sunt secundariae; et id ex eo deducendum, quod haec quoque organa gangliari systemati, quod est et habetur velut sedes febrium, sunt subjecta.

IV. Quoad febres intermittētes legitimas, quae ab ipsothenia putantur oriri, ex eo quod cortex peruvianus vincatur, ut probabiliter et mihi videtur admittenda opinio, per quam hujusmodi febres originem trahunt a speciali quodam systematis gangliaris irritatione, quam palustria miasmata producant. Quamvis et amini pathemata, et hujusmodi alia has eandem febres gignant, quas cortex tantum peruvianus, aut sua praeparata debellant. Hinc maximo in errore versatur Broussais, qui cum cortex peruvianus et suorum praeparatorum vim contradictoriam inveniret in febribz intermittētibz, quas juxta suam theoriam a gastridē derivat, hujusmodi pharmaci actionem se se explicare parat, cum ait, hoc pharmacum in pyrexia exhibitum agere, si excitet irritationem fixam atque continuam in stomacho, antequam transitio febrilis intermittētis superveniat; aut si hoc in viscere excitet irritationem, quae alterius organi febrilem

30

irritationem procedat; aut si agit ut collinis irritantia, quae epistalmiam, dummodo ipsa sit intensa, debellant.

V. Viscerum et organorum contentuum dolores, qui in febribus comitatis observantur, quavis periodici sint, possunt tamen esse variae morbosae affectiones inflammatoriae. Jam videmus, typum et febriem et ceterorum morborum esse omnino incertum, et quaecunque sit elementum pathologicum, sive irritatio, sive fluxus et congestio, sive phlogosis, sive vitia organica, a quo pendant; tamen tamen peculiaribus et incertis de causis typum aut continuam, aut remittentem, aut intermittentem, possunt offere. Et quamvis vel Thomassin sit dubius in admitteendis periodicis inflammationibus, et velit has organorum affectiones, quae in hujusmodi febribus observantur, in surgere quodam seu incremento vasorum, potiusquam in processu phlogistico consistere; tamen sectiones cadaverum illorum hominum, qui hinc febribus correpti perierant, hinc in organis veras vias inflammationis, et profundas perturbaciones, quae in vero phlogistico processu observantur, ostenderunt.

VI. Status hic morbosus est idiopaticus, est spasmodicus gangliis sympathicis, a quo solida procedit, cordis actionem et systema circulare perturbat, nunc accelerando, nunc retardando motu, nunc spasmodice contrahendo, nunc relaxando tunicas; ita et, quo

se se offerant, modo explicatur febrilia symptomata, nempe frigus, calor, sudor, pulsuum status in diversis febrium intermissionum studiis. Si febris incipit a spasmō in cordis et arteriarum fibris muscularibus tunc habetur frigus, cui calor succedit, et inde sudor, cum hoc eodem spasmō sublato, vis circularis augetur. Frigus non habetur, si febris ens cum motus circularis regnante incipiat; perducit frigus perdurans spasmō, de quo supra diximus; hinc febris algida Tori, et nonnullae aliae huius drillinae habeantur.

VII. Quoad febres intermittentes larratas, quas a continuis ex eo differant, quod in illis dolentes sensationes periodicae ceteris in organis atque systematibus observantur, quin minimum habeatur indicium perturbationis circularis systematis; haec cum theoria quam nos statimus, minime repugnant. Huiusmodi cum in febribus possit consistere eadem species morbosae conditio systematis gangliarum, quae cum cortice peruvianō et cum praeparatis debellamus, quin ulla obscuriter indicia in organis quae illi proxime sunt subiecta, et id ex eo repetendum, quod nimis frequenter observamus, in aliqua humani corporis parte valde remota ab illa, quae est proxima morboſi processus sedes, dolores et morboſa phaenomena existere, quin phaenomena his respondenda hanc perturbationem manifestant. *Possunt* igitur, ut verbis utar cel. Geromini, conditionem materialē doloris qua-

dam in parte existere, et dolores ipsam, aut sensationes hinc dolori respondentes alia in parte patescere.

VIII. Cum pervenisse febris processu, illa de causis quas supra exposuimus, et fluidarum et solidarum partium assimilationis perturbetur, et hinc molecule quaedam morbosae morbosaeque elementa generentur, haec veluti vitae principio inimica sunt expellenda; et tunc tantummodo hujusmodi expulsionem habemus, cum vitæ febrilis causa, vitale principium eo in statu sit positum, in quo contra molecule hasce morbosas morbosaeque elementa, quae eorum decursu perdurantis apparuerant, regi valet. Ut hoc obtineamus, statim emunctoria communia aperiantur, et hujusmodi molecule, sive elementa expellantur aut per sudorem, aut per urinam, aut per secretum, etc., vel si in partem aliquam externam transferantur, tumores inflammatorii, suppurationes, abscessus, etc. efformant; et ita, ut uno verbo utar, crisi habemus. Hujusmodi tamen crises non sunt causa, sed potius vici morbi effectus, utpote quae in ordinem reductionem assimilationis dynamicae organismi, quem processus febrilis causae perturbaverant, ostendant.

THESES

I.

Non textus cellularis, sed lamellarum textura est primum solidiorum organicorum elementum.

II.

In Fabricae nervorum systema vasculari praeceat: illud functionem omnium tam organicorum, quam animalium est principium.

III.

Inter varios emittendi sanguinis modos arteriothomia est, quae directius in cerebri morbis agit.

IV.

Methodus quae per cutem, aut integram, aut epidermide destitutam, vesicante medicamina introducitur, illis aegrotantibus, qui propter nimiam stomachi excitabilitatem, aut propter phlogosin mucosae tunicae stomachi ejusdem, medicamina hac introducta via ferre non possunt, est valde utilis.

V.

In febribus intermittens cortex peruvianus ut anti periodicus mere agit.

1

1. 2

1

1

1

1

1

1

1

